

**17 noiembrie Acționează ACUM**  
**Elimină cancerul de col uterin!**

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat **Strategia Globală pentru eliminarea cancerului de col uterin** pe 17 noiembrie 2020.

**Obiectiv:** până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și să se mențină **sub pragul de 4 cazuri noi la 100.000 de femei.**

90% din fetițe să fie vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani

70% din femeile adulte să fie testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani

90% din femeile cu teste pozitive să beneficieze de tratament al leziunilor pre-canceroase și al celor maligne


90%

70%

90%

Strategia a fost adoptată printr-o rezoluție susținută de 194 de țări. Atingerea obiectivului este posibilă dacă sunt îndeplinite cele 3 ținte esențiale: vaccinare, screening și tratament.

România are cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin în Uniunea Europeană (2022)



Incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin în țările UE, 2022, ASR/‰00 femei (raportat la populația standard europeană 2013)

[https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical\\_cancer\\_en-Nov\\_2021.pdf](https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical_cancer_en-Nov_2021.pdf)

Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat Strategia globală pentru eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2030.

### CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

- 1 Prevenirea prin vaccinare**  
Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung împotriva cancerului de col uterin.
- 2 Screening și tratament al leziunilor pre-canceroase**  
Previne evoluția malignă a leziunilor pre-canceroase.
- 3 Tratamentul adecvat și la timp pentru cancerul de col uterin invaziv**

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

**17 noiembrie 2025**

**Ziua de acțiune pentru Eliminarea cancerului de col uterin**



**Acționează ACUM**  
**Informează-te!**  
**Vaccinează-te!**  
**Testează-te!**




MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII



Institutul  
Național de  
Sănătate Publică

## CE ESTE cancerul de col uterin?



Este un tip de cancer care începe în celulele colului uterin, partea inferioară și îngustă a uterului. Este cauzat aproape întotdeauna de o infecție persistentă cu virusul papiloma uman (HPV). Infecția cu HPV poate determina apariția unor modificări precanceroase ale celulelor care, în timp, pot evolua către cancer dacă nu sunt depistate și tratate din timp.

Celulele anormale din colul uterin se multiplică necontrolat și pot forma o tumoră.

## CINE ESTE LA RISC de a dezvolta cancer de col uterin?

- Toate femeile care și-au început viața sexuală.
- Riscul crește în prezența unor factori precum:
  - debutul precoce al vieții sexuale;
  - partenerii sexuali multipli;
  - fumatul;
  - un sistem imunitar slăbit;
  - infecții repetate cu HPV.
- Cel mai frecvent apare la femei în vârstă de 35-44 ani.

## CARE SUNT SIMPTOMELE cancerului de col uterin?

- În mod obișnuit nu există simptome în stadiile incipiente.
- Când apar, semnele cel mai des întâlnite sunt:
  - sângerări vaginale anormale;
  - scurgeri vaginale anormale;
  - durere la contactul sexual;

Aceste simptome apar și în alte afecțiuni, fără a semnifica neapărat un cancer de col uterin. În cazul în care apar, adresați-vă imediat medicului!

## Din ce cauză apare cancerul de col uterin?

- Peste 90% din cazuri sunt cauzate de infecția cu HPV;
- HPV se transmite prin contact sexual și prin contact cu tegumente infectate;
- 8 persoane din 10 se infectează cu HPV cel puțin o dată în cursul vieții;
- În majoritatea cazurilor infecția se va vindeca de la sine, fără urmă;
- Uneori, infecția HPV persistentă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase;
- Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer;
- Între infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani.
- Infecția cu HPV nu prezintă simptome.

## Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti HPV și screening!



## Vaccinarea și screening-ul pot salva vieți!

Infecția HPV poate cauza și alte cancere: vagin, vulva sau penis, anus și orofaringeale (cancere ale gurii, limbii, amigdale).

## INFECȚIA CU HPV poate fi tratată?

- Nu există tratament pentru infecția cu HPV.
- Pot fi tratate efectele produse de infecția HPV.

## HPV NU înseamnă HIV

- Virusul Papilloma Uman (HPV) și Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) sunt viruși foarte diferiți;
- HPV și HIV provoacă probleme de sănătate diferite.

## VACCINAREA anti – HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin

- Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- Riscul de infecție este la fel de mare la fete și băieți. Momentul optim pentru vaccinare este înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV).
- Răspunsul imun este mai bun la vârste tinere, față de adulți.

## În România, vaccinarea anti HPV este:

- **gratuită pentru fete și băieți între 11 ani și 26 ani**
- **compensată 50% pentru femei între 27 ani și 45 de ani**

## SCREENING-UL pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă 25 – 64 ani pentru a depista leziuni precanceroase.

Dacă apar leziuni precanceroase, pot fi tratate și nu vor mai evolua malign prevenind astfel apariția cancerului de col uterin!

## RECOMANDARI SCREENING

Femei între 25-64 ani:

- test HPV
- efectuat o dată la fiecare 5 ani

**Dacă aveți între 25 și 64 de ani urmați recomandările medicului dvs. de a participa la screening organizat populațional al cancerului de col uterin pentru un test gratuit!**

**Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare și screening și poate fi vindecat dacă este depistat la timp și tratat corespunzător!**